

# KARAKAYA

## Koca Fiğ (*Vicia narbonensis* L.)



|   |   |
|---|---|
| <b>Tescil yılı</b>                        | 2009  |
| <b>İslah edildiği yer ve yılı</b>         | Türkiye -2004   |
| <b>Çeşit sahibi kuruluş</b>               | Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Diyarbakır  |
| <b>Çeşidin İslahçısı</b>                  | Doç. Dr. Mehmet BAŞBAĞ<br>D.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü  |
| <b>İslah yöntemi</b>                      | Seleksiyon  |
| <b>Morfolojik özellikleri</b>             | Yaşam süresi : Tek yıllık<br>Bitkide bakla sayısı : 6-13 adet<br>Baklada tohum sayısı : 4-6 adet  |
| <b>Yetiştirme amacı</b>                   | Tane yem olarak değerlendirilmektedir.  |
| <b>Teknolojik özellikleri (Tane)</b>      | Kuru madde : % 91.0<br>Ham protein : % 28.1<br>Ham selüloz : % 6.0<br>Ham yağ : % 1.3   |
| <b>Tarımsal özellikleri (Kışlık ekim)</b> | Çiçeklenme gün sayısı : 106-148 gün<br>Fizyolojik olum gün sayısı : 137-199 gün<br>1000 tane ağırlığı : 121.5 g<br><br>Tescil denemelerindeki; :<br>Ortalama biyolojik verim : 857.7 kg/da (394.3-1368.2)<br>Ortalama tane verimi : 231.9 kg/da (120.2-344)<br>Ortalama kes verimi : 625.9 kg/da (255.8-1024.2) |
| <b>Tavsiye edildiği bölgeler</b>          | Güney Doğu, Akdeniz ve Ege bölgelerine tavsiye edilir.  |